

Coordonnées du travailleur examiné - Coordonnées employeur	
Dossier	NE LE
Nom, prénom	
Adresse employeur	

## FICHE DE LECTURE DE TEST TUBERCULINIQUE (2 UNITÉS PPD)

Pratiquée le ..... à lire le ..... (entre 72 et 120 h après l'injection)

au niveau de: l'avant-bras gauche  droit

BCG	<input type="checkbox"/> connu	<input type="checkbox"/> douteux	<input type="checkbox"/> inconnu
-----	--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

ABSENCE TOTALE DE REACTION
----------------------------

ERYTHEME (ROUGEUR) SEUL <input type="checkbox"/>
--------------------------------------------------

<b>REACTION :</b> Type d'induration : 1. très dure : <input type="checkbox"/> 2. dure : <input type="checkbox"/> 3. molle : <input type="checkbox"/> 4. très molle : <input type="checkbox"/>  Diamètre de l'induration : Le calcul est obtenu par la « pen method » (*) 1. Inférieur à 5 mm : <input type="checkbox"/> mm 2. Entre 5 et 9 mm : <input type="checkbox"/> mm 3. Entre 10 et 17 mm : <input type="checkbox"/> mm 4. Supérieur à 18 mm : <input type="checkbox"/> mm	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Autres réactions observées :	<input type="checkbox"/> Œdème	<input type="checkbox"/> Lymphangite
------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------

Date de lecture :	Nom de la personne qui a réalisé la lecture	Cachet ou signature du médecin.	Date, visa, et conclusion du médecin du travail :

**Résultats à renvoyer à :** Centre Cohezio ZONE BRABANT / NAMUR / LUXEMBOURG  
Adresse : RUE EUGENE THIBAUT, 1A, 5000 NAMUR

\* La pen method permet de mesurer plus aisément la dimension de l'induration. Elle consiste à faire glisser la pointe d'un feutre fin ou d'un bic jusqu'à ce qu'elle bute sur l'induration et de recommencer la même opération du côté opposé ; il suffit alors de mesurer le nombre de mm séparant les 2 points. (Source : Recommandations concernant le dépistage cible et le traitement de l'infection tuberculeuse latente FARES, 2003, 25 p.)